

V3	05/06/2025 - SP / ACK	Pays	Langues	Fonte
	Code article <span> </span> : <b>937893</b>	IR	EN/AR	Noto Sans Condensed
Référence Pantone U <span> </span> : Black	Format à plat	Format plié	Font size mini (main text) (pts)	
Référence TD <span> </span> : TD-LFT-101595	190 x 315 mm	98 x 20 mm	5.5	



314 937893

# Vaxigrip

Suspension for injection in pre-filled syringe

## Trivalent influenza vaccine (split virion, inactivated)

### 2025-2026 season

Read all of this leaflet carefully before you or your child are vaccinated, because it contains important information for you.
<ul style="list-style-type: none"><li>Keep this leaflet. You may need to read it again.</li> <li>If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.</li> <li>This medicine has been prescribed for you or your child only. Do not pass it on to others.</li> <li>If you or your child get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.</li></ul>

What is in this leaflet

- What Vaxigrip is and what it is used for
- What you need to know before you or your child use Vaxigrip
- How to use Vaxigrip
- Possible side effects
- How to store Vaxigrip
- Contents of the pack and other information

1. What Vaxigrip is and what it is used for
---

Vaxigrip is a vaccine. This vaccine, administered to you or your child from 6 months of age, helps to protect you or your child against influenza (flu). When a person is given Vaxigrip, the immune system (the body's natural defence system) will produce its own protection (antibodies) against the disease. When administered during pregnancy, the vaccine helps to protect the pregnant woman but also helps to protect her baby(ies) from birth to almost 6 months of age through the transmission of protection from mother to baby during pregnancy (see also Sections 2 and 3). None of the ingredients in the vaccine can cause flu. The use of Vaxigrip should be based on official recommendations. Flu is a disease that can spread rapidly and is caused by different types of strains that can change every year. Due to this potential change in circulating strains on a yearly basis, as well as the duration of protection intended by the vaccine, vaccination is recommended every year. The greatest risk of catching flu is during the cold months, between October and March. If you or your child were not vaccinated in the autumn, it is still sensible to be vaccinated up until the spring since you run the risk of catching flu until then. Your doctor will be able to recommend the best time to be vaccinated. Vaxigrip is intended to protect you or your child against the three strains of virus contained in the vaccine about 2 to 3 weeks after the injection. In addition, if you or your child are exposed to flu immediately before or after your vaccination, you or your child could still develop the illness as the incubation period for flu is a few days. The vaccine will not protect you or your child against the common cold, even though some of the symptoms are similar to flu.

2. What you need to know before you or your child use Vaxigrip
--

To make sure that Vaxigrip is suitable for you or your child, it is important to tell your doctor or pharmacist if any of the points below apply to you or your child. If there is anything you do not understand, ask your doctor or pharmacist to explain.

Do not use Vaxigrip

- If you or your child are allergic to:
  - The active substances, or
  - Any of the other ingredients of this vaccine (listed in section 6), or
  - Any component that may be present in very small amounts such as eggs (ovalbumin, chicken proteins), neomycin, formaldehyde or octoxinol-9.
- If you or your child have an illness with a high or moderate temperature or an acute illness, the vaccination should be postponed until after you or your child have recovered.

V3	05/06/2025 - SP / ACK	Pays	Langues	Fonte
	Code article <span> </span> : <b>937893</b>	IR	EN/AR	Noto Sans Condensed
Référence Pantone U <span> </span> : Black	Format à plat	Format plié	Font size mini (main text) (pts)	
Référence TD <span> </span> : TD-LFT-101595	190 x 315 mm	98 x 20 mm	5.5	

#### Warnings and precautions

Talk to your doctor, your pharmacist or your nurse before using Vaxigrip. You should tell your doctor before vaccination if you or your child have:

- A poor immune response (immunodeficiency or taking medicines affecting the immune system),
- Bleeding problem or bruising easily.

Your doctor will decide if you or your child should receive the vaccine. Your doctor occur (mostly in adolescents) following, or even before, any needle injection. Therefore, tell your doctor or nurse if you or your child fainted with a previous injection. As with all vaccines, Vaxigrip may not fully protect all persons who are vaccinated. Not all babies less than 6 months of age born to pregnant women vaccinated during pregnancy may be protected.

If, for any reason, you or your child have a blood test within a few days following a flu vaccination, please tell your doctor. This is because false positive blood test results have been observed in a few patients who had recently been vaccinated.

**Children**

Vaxigrip is not recommended for use in children below 6 months of age.

**Other medicines and Vaxigrip**

Tell your doctor or pharmacist if you or your child are receiving, have recently received or might receive any other vaccines or any other medicines.

- Vaxigrip can be given at the same time as other vaccines by using separate limbs.
- The immunological response may decrease in case of immunosuppressant treatment, such as corticosteroids, cytotoxic drugs or radiotherapy.

**Pregnancy and breast-feeding**

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant, ask your doctor or pharmacist for advice before using this vaccine.

Vaxigrip can be used in all stages of pregnancy.

Vaxigrip may be used during breast-feeding.

Your doctor/pharmacist will be able to decide if you should receive Vaxigrip.

**Driving and using machines**

Vaxigrip has no or negligible influence on the ability to drive and use machines.

**Vaxigrip contains potassium and sodium**

This medicine contains less than 1 mmol potassium (39 mg) and less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, that is to say it is essentially "potassium-free" and "sodium-free".

3. How to use Vaxigrip
------------------------

**Dosage**

Adults receive one 0.5 mL dose.

**Use in children**

Children from 6 months to 17 years of age receive one 0.5 mL dose.

If your child is less than 9 years old and has not been previously vaccinated against flu, a second dose of 0.5 mL should be given after an interval of at least 4 weeks. If you are pregnant, the 0.5 mL dose administered to you during pregnancy may protect your baby from birth to almost 6 months of age. Ask your doctor or pharmacist for more information.

**How Vaxigrip is given**

Your doctor or nurse will administer the recommended dose of the vaccine as an injection into the muscle or under the skin.

**If you or your child receive more Vaxigrip than you should**

In some cases, more than the recommended dose has been inadvertently administered. In these cases, when side effects were reported, they were in line with what is described following the administration of the recommended dose (see Section 4).

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects
--------------------------

Like all medicines, this vaccine can cause side effects, although not everybody gets them.

**Allergic reactions**

Contact your doctor or a healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency room immediately if you or your child experience allergic reactions (reported as rare: may affect up to 1 in 1,000 people) that can be life threatening. Symptoms may include rash, itching, hives, redness, difficulty breathing, shortness of breath, swelling of the face, lips, throat, or tongue, cold, clammy skin, palpitations, dizziness, weakness or fainting.

**Other side effects reported in adults and elderly**

*Very common (may affect more than 1 in 10 people):*

- Headache, muscular pain (myalgia), malaise <sup>(۱)</sup>, pain at the injection site.

<sup>(۱)</sup> Common in elderly

*Common (may affect up to 1 in 10 people):*

- Fever <sup>(۲)</sup>, shivering, reactions at the injection site: redness (erythema), swelling, hardness (induration).

<sup>(۲)</sup> Uncommon in elderly

*Uncommon (may affect up to 1 in 100 people):*

- Dizziness <sup>(۱)</sup>, diarrhoea, nausea <sup>(۱)</sup>, fatigue, reactions at the injection site: bruising (ecchymosis), itching (pruritus), and warmth.
- Rare in adults <sup>(۱)</sup> Rare in elderly
- Hot flush: only seen in the elderly.
- Swelling of the glands in the neck, armpit or groin (lymphadenopathy): only seen in adults.

*Rare (may affect up to 1 in 1,000 people):*

- Anomalies in the perception of touch, pain, heat and cold (paraesthesia), sleepiness, increased sweating (hyperhidrosis), unusual tiredness and weakness (asthenia), flu-like illness.

- Joint pain (arthralgia), discomfort at the injection site: only seen in adults.

**Other side effects reported in children from 3 to 17 years of age**

*Very common (may affect more than 1 in 10 people):*

- Headache, muscular pain (myalgia), malaise, shivering <sup>(۱)</sup>, reactions at the injection site: pain, swelling, redness (erythema) <sup>(۱)</sup>, hardness (induration) <sup>(۱)</sup>.

<sup>(۱)</sup> Common in children from 9 to 17 years of age

*Common (may affect up to 1 in 10 people):*

- Fever, bruising (ecchymosis) at the injection site.

*Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) in children from 3 to 8 years of age:*

- Temporary reduction in the number of certain blood elements called platelets; a low number of these can result in excessive bruising or bleeding (transient thrombocytopenia): only seen in one child of 3 years of age.
- Moaning, restlessness.
- Dizziness, diarrhoea, vomiting, upper abdominal pain, joint pain (arthralgia), fatigue, warmth at the injection site.
- Diarrhoea, itching (pruritus) at the injection site.

*Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) in children from 9 to 17 years of age:*

- Diarrhoea, itching (pruritus) at the injection site.

**Other side effects reported in children from 6 to 35 months of age**

*Very common (may affect more than 1 in 10 people):*

- Vomiting <sup>(۱)</sup>, muscular pain (myalgia) <sup>(۱)</sup>, irritability <sup>(۱)</sup>, appetite loss <sup>(۱)</sup>, generally feeling unwell (malaise) <sup>(۱)</sup>, fever.

<sup>(۱)</sup> Uncommon in children from 24 to 35 months of age <sup>(۲)</sup> Rare in children less than 24 months of age

- Reactions at the injection site: pain/tenderness, redness (erythema).

- Headache: only seen in children from 24 months of age.

- Drowsiness, unusual crying: only seen in children less than 24 months of age.

*Common (may affect up to 1 in 10 people):*

- Shivering: only seen in children 24 months and older.

- Reactions at the injection site: hardness (induration), swelling, bruising (ecchymosis).

*Uncommon (may affect up to 1 in 100 people):*

- Diarrhoea, hypersensitivity.

*Rare (may affect up to 1 in 1,000 people):*

- Flu-like illness, reactions at the injection site: rash, pruritus (itching).

In children from 6 months to 8 years of age who received 2 doses, side effects were similar after the first and after the second dose. Fewer side effects may happen after the second dose in children from 6 to 35 months of age.

When seen, side effects generally happen in the first 3 days after the vaccination and go away by themselves in 1 to 3 days after they start. The intensity of observed side effects was mild. Side effects were generally less frequent in elderly than in adults and children.

The following side effects have been reported after administration of Vaxigrip. These side effects may occur with Vaxigrip:

- pain situated on the nerve route (neuralgia), convulsions, neurological disorders that may result in stiff neck, confusion, numbness, pain and weakness of the limbs, loss of balance, loss of reflexes, paralysis of part or all the body (encephalomyelitis, neuritis, Guillain-Barré syndrome)

#### مرد همدار و احتیاط مصرف

قبل از تلقیح Vaxigrip با پزشک، دکتر داروساز و یا پرستار خود مشورت کنید. قبل از انجام واکسیناسیون با پزشک خود صحبت کنید در صورتیکه شما و یا فرزندان:
• جاری نفس سیستم ایمنی هشتید (Immunodeficiency) و یا دارویی مصرف می کنید که سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار میدهد.

• اگر مشکل خونریزی دارید و یا به آسانی دچار کبودی می شوید
• پزشک شما در مورد واکسینه شدن شما و یا فرزندان تصمیم می گیرد
• قبل یا هنگام تزریق ممکن است غش رخ بدهد (معدتا در نوجوان). چنانچه شما یا فرزندان سابقه غش یا تیرقزات قبلی را دارید، پزشک یا پرستار خود را مطلع کنید.

هاندن سایر واکسنها، Vaxigrip ممکن است موجب ایمنی کامل در تمام انحصام واکسینه شده گردد.

واکسیناسیون در طی بارداری موجب ایمنی کامل نمایی کودکان زیر شش ماهه نمی گردد.
چنانچه به هر دلیلی شما و یا فرزندان در چند روز اول پس از واکسینه شدن مجبور به انجام آزمایش خون هشتید لطفاً پزشک خود را مطلع کنید زیرا که خطای مثبت کاذب، در آزمایش خون افراد معدودی که چند روز پس از واکسینه شدن مورد آزمایش قرار گرفته اند، گزارش شده است.

#### کودکان

مصرف Vaxigrip برای کودکان زیر ۶ ماه توصیه نمی شود.

• چنانچه شما و یا فرزندان درحال مصرف دارویی می باشید و یا اخیراً دارویی مصرف نموده اید، و یا چنانچه ممکن است واکسن با داروی خاصی همزمان بزناید، حتماً پزشک خود یا دکتر داروساز را مطلع کنید.

• اگر شما یا فرزندتان با واکسنهای دیگر تزریق کرده به شرط آنکه هر کدام در دو عضو مجزا خون هشتید لطفاً پزشک خود را مطلع کنید زیرا که خطای مثبت کاذب، در آزمایش خون افراد معدودی که چند روز پس از واکسینه شدن مورد آزمایش قرار دارند گزارش شده است.

#### مصرف در حاملگی و شیر گیری

در صورت بارداری و شیردهی، احتمال بارداری و یا در صورتیکه که قصد بچه دار شدن را دارید، از پزشک خود یا دکتر داروساز در مورد دریافت این واکسن مشورت بگیرید.

Vaxigrip نتواند در تمام مراحل بارداری مصرف گردد.

Vaxigrip ممکن است در طی دوران شیردهی مصرف گردد.

پزشک شما و یا دکتر داروساز قادر است در مورد تلقیح Vaxigrip تصمیم گیری کند.

**رگدگی و گر با مائین آلات**

Vaxigrip تاثیراتی با تاثیر ناچیز بر گزاری شما برای رگدگی و یا گر با مائین آلات دارد.

این دارو حاوی کمتر از ۱ میلی مول بتاسیم (۳۹ میلی گرم) و ۱ میلی مول سدیم (۲۳ میلی گرم) در هر دوز می باشد، به عبارت دیگر اسامد فالد سدیم و بتاسیم است.

۲- نحوه مصرف Vaxigrip
<b>میزان مصرف</b>
میزان مصرف در بزرگسالان بالای ۱۵ سال: میلی لیتری می باشد.
<b>میزان مصرف در کودکان</b>
دوز مصرف در کودکان ۶ ماه تا ۱۷ سال یک دوز ۰۵ میلی لیتری می باشد.
اگر فرزند شما کوچکتر از ۶ سال است و قبلاً بر علیه آنفلوآنزا واکسینه نشده است، دوز دوم ۰۵ میلی لیتر باید حداقل ۴ هفته بعد از دوزت اول واکسیناسیون تلقیح شود.
در صورتی که باردار هشتید، تزریق ۰۵ میلی لیتر واکسن در طی بارداری، باعث محافظت کودک شما از تا ۶ ماهگی میگرد، جهت دریافت اطلاعات بیشتر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
<b>روشی های تزریق</b>
پزشک یا پرستار شما دوز مورد نیاز واکسن را داخل عضله و یا به صورت زیرجلدی عمیق تزریق می نمایند.
در صورتی که شما و یا فرزندان مقادیر بیشتری از Vaxigrip را دریافت نموده
در برخی موارد، به اشتباه شده است دوز توصیه شده به شما تزجوز می گردد در این موارد وقتی عوارض جانبی گزارش شده است، دوز پس از تزجوز دوز توصیه شده بکشن بوده است (به بخش ۴ مراجعه شود).
چنانچه هر سوال دیگری در مورد مصرف این محصول داشتید از پزشک خود (یا دکتر داروساز) سؤال کنید.

۴- عوارض ناخواسته محتمل
مانند سایر داروها این واکسن می تواند باعث بروز عوارض ناخواسته ای گردد که البته در همه افراد بروز نمی کند.
<b>واکنش های حساسیتی</b>
چنانچه شما و یا فرزندان واکنش های آروگیک را که تهدید کننده حیات می باشد (به صورت نادر گزارش شده است، یک نفر از هر ۱۰۰۰ نفر را تحت تاثیر قرار می دهد)، تجربه کردید، با پزشک و یا فرد متخصص سلامت نمایی بگیرید و یا فوراً به نزدیک گلو و یا زبان، سرمه، سردرد و سرد و مرطوب، تپش قلب، سرگیجه، هعف و غش می باشد.

<ul style="list-style-type: none"><li>blood vessel inflammation (vasculitis) which may result in skin rashes and in very rare cases in temporary kidney problems</li> <li>transient thrombocytopenia, lymphadenopathy, paraesthesia in other age groups than those described above for these side effects.</li></ul>
<b>Reporting of side effects</b>
If you or your child get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.
<b>5. How to store Vaxigrip</b>
<p>Keep this vaccine out of the sight and reach of children. Do not use this vaccine after the expiry date which is stated on the label and carton after EXP. The expiry date refers to the last day of that month. Store in a refrigerator (2°C – 8°C). Do not freeze. Keep the syringe in the outer carton in order to protect from light. Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.</p>
<b>6. Contents of the pack and other information</b>

<b>What Vaxigrip contains</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>The active substances are: Influenza virus (inactivated, split) of the following strains*: <div> <div>A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like strain</div> <div>(A/Victoria/4897/2022, IVR-238)..... 15 micrograms HA**</div> </div> <div> <div>A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like strain</div> <div>(A/Croatia/10136RV/2023, X-425A)..... 15 micrograms HA**</div> </div> <div> <div>B/Austria/1359417/2021-like strain</div> <div>(B/Michigan/01/2021, wild type)..... 15 micrograms HA**</div> </div> <div>Per 0.5 mL dose</div> </li></ul>

• propagated in fertilised hens' eggs from healthy chicken flocks
• haenagglutinin
This vaccine complies with the WHO (World Health Organisation) recommendations (Northern Hemisphere) and EU decision for the 2025-2026 season.
• The other ingredients are: a buffer solution containing sodium chloride, potassium chloride, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, and water for injections. Some components such as eggs (ovalbumin, chicken proteins), neomycin, formaldehyde or octoxinol-9 may be present in very small amounts (see section 2).

**What Vaxigrip is and contents of the pack**

The vaccine, after shaking gently, is a colourless opalescent liquid. Vaxigrip is a suspension for injection presented in a pre-filled syringe of 0.5 mL, with attached needle or without needle, in box of 1, 10 or 20. Not all pack sizes may be marketed.

**Marketing authorisation holder**

**Sanofi Winthrop Industrie**  
82 Avenue Raspail  
94250 Gentilly  
**Local Importer:** Rougine Darou Company  
Address: 3rd Floor, No.2, Kimia Bldg., End of Media Kashigar, 1st Peyvand St., Eastern side of Farhang Sq., Saadat Abad, Tehran, Iran Phone: +98 21 27605000  
**This leaflet was last revised in: 06/2025.**

**The following information is intended for healthcare professionals only:**
As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment and supervision should always be readily available in case of an anaphylactic reaction following the administration of the vaccine. The vaccine should be allowed to reach room temperature before use. Shake before use. Inspect visually prior to administration. The vaccine should not be used if foreign particles are present in the suspension. It should not be mixed with other medicinal products in the same syringe. This vaccine is not to be injected directly into a blood vessel. See also section 3. How to use Vaxigrip.

# Vaxigrip

## سوسپانسیون در سرنگ از پیش پر شده واکسن آنفلوآنزای سه ظرفیتی ( ویریون اسلیبلت، غیر فعال شده) سوشهای سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵

خواهشمند است قبل از واکسینه شدن خود و یا فرزندان این بروشور را کامل و به دقت مطالعه کنید. زیر حاوی اطلاعات مهمی برای شما می باشد.
• از آنجا که ممکن است مجدداً به مطالعه بروشور نیاز داشته باشید، آن را نزد خود نگه دارید.
• در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، سوالات خود را از پزشک، دکتر داروساز و یا پرستار خود بپرسید.
• این واکسن فقط برای شما و یا فرزندان تجویز شده است. لطفاً از توصیه آن به دیگران جداً خودداری فرمایید.
• چنانچه شما و یا فرزندان دچار عوارض ناخواسته ای شدید، با پزشک، دکتر داروساز و یا پرستار خود مشورت نمایید. این توصیه شامل هرعارضه ناخواسته ای محتمل دیگر که در این بروشور ذکر نشده نیز می شود. (به قسمت ۴ بروشور مراجعه شود)

<b>در این بروشور می خواهید:</b>
۱- Vaxigrip چیست و موارد مصرف آن کدامند؟
۲- آنچه لازم است قبل از تلقیح Vaxigrip به خود یا فرزندان، بدانید.
۳- نحوه مصرف Vaxigrip
۴- عوارض ناخواسته محتمل
۵- شرایط نگهداری Vaxigrip
۶- محتویات جعبه و سایر اطلاعات
<b>۱- Vaxigrip چیست و موارد مصرف آن کدامند؟</b>
Vaxigrip یک واکسن است.
این واکسن به شما و یا فرزندان از سن شش ماهگی کمک می کند تا بر برابر آنفلوآنزا محافظت شوید. پس از تلقیح واکسن Vaxigrip به شخصی، سیستم ایمنی (سیستم طبیعی دفاعی بدن) شروع به دفاع از خود (از طریق تولید بادی) در مقابل بیماری می نمایند. تجویز این واکسن در زمان بارداری علاوه بر محافظت از خانم باردار، از طریق انتقال بادی از مادر به کودکان در طی بارداری، باعث محافظت از کودک از زمان تولد تا ۶ ماهگی می گردد (به قسمت ۳ و ۴ مراجعه شود).
هیچکدام از محتویات واکسن باعث بروز بیماری آنفلوآنزا نمی شوند.
مصرف Vaxigrip با بایست بر اساس توصیه های رسمی باشد.
آنفلوآنزا بیماری است که به سرعت می تواند منتشر گردد و عامل آن سوشهای مختلف ویروس است که هر ساله می تواند تغییر کنند. با توجه به تغییر سالانه سوش های در گردش و همچنین مدت زمان ایمنی ایجاد شده توسط واکسن، انجام واکسیناسیون هر ساله توصیه می شود. شایع ترین زمان ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در خلال ماههای سرد سال (مهر تا اسفند) می باشد. اگر شما یا فرزندان در پاییز واکسینه نشده اید، تا بهار نیاز دارید تا واکسن دریافت کنید زیرا تا آن زمان احتمال مبتلا شدن شما (یا فرزندان) به آنفلوآنزا وجود دارد. پزشک شما قادر است تا بهترین زمان واکسیناسیون را به شما توصیه نماید.
شما (یا فرزندان) حدود ۲ تا ۳ هفته پس از تلقیح Vaxigrip در مقابل سه سوش از ویروس که واکسن از آن تهیه شده است، محافظت خواهید شد.
همچنین اگر شما یا فرزندان بلافاصله پیش و یا پس از انجام واکسیناسیون در معرض آنفلوآنزا قرار گرفتید، احتمال ابتلا به بیماری برای شما وجود دارد؛ زیرا که دوره کمون (Incubation) بیماری آنفلوآنزا چند روزه می باشد.
این واکسن شما را در برابر سرما خوردگی معمولی محافظت نمی نماید، اگر چه که برخی از نشانه های آن مشابه آنفلوآنزا می باشد.

#### ۲- آنچه لازم است قبل از تلقیح Vaxigrip به خود و فرزندان بدانید:

برای اطمینان از مناسب بودن Vaxigrip برای شما و یا فرزندان از برای است که در صورت دارا بودن هر یک از شرایط ذیل با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمایید. در صورت عدم اگاهی نسبت به هر یک از موارد زیر، از پزشک یا دکتر داروساز بخواهید تا توضیحات لازم را به شما ارائه دهد.

<b>۱- استفاده نکنید:</b>
اگر شما یا واکسن به موارد زیر حساسیت دارید:
• ماده مؤثره، یا
• هر یک از سایر ترکیبات این واکسن (ذکر شده در بخش ۶)، یا
• هر اجزایی که ممکن است در مقادیر بسیار کم وجود داشته باشند مانند تخم مرغ (اوالبوئین، پروئین مرغ)، نئومایسین، فرمالدهید یا اکتوکسینول-۹.
اگر شما یا فرزندان بیماری با تب بالا یا متوسط یا بیماری حاد دارید، واکسیناسیون باید تا پس از بهبودی شما یا فرزندان به تعویق بیفتد.

# sanofi