



395 897932

MenQuadfi®

MenQuadfi®

solution for injection
Meningococcal group A, C, W and Y
conjugate vaccine

Read all of this leaflet carefully before you or your child are given this vaccine because it contains important information for you or your child.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.
- This vaccine has been prescribed for you or your child only. Do not pass it on to others
- If you or your child get any side effects, talk to your doctor, pharmacist, or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet

1. What MenQuadfi is and what it is used for
2. What you need to know before you or your child are given MenQuadfi
3. How MenQuadfi is given
4. Possible side effects
5. How to store MenQuadfi
6. Contents of the pack and other information

1. What MenQuadfi is and what it is used for

MenQuadfi is a vaccine that can be given to children from 1 year of age, adolescents and adults. MenQuadfi helps to protect against infections caused by a type of bacteria (germs) called “*Neisseria meningitidis*”, specifically against types A, C, W and Y. *Neisseria meningitidis* bacteria (also called meningococci) can be

passed from person to person and can cause serious and sometimes life-threatening infections, such as:

- Meningitis – an inflammation of the tissues that surround the brain and spinal cord;
- Septicaemia – an infection of the blood.

Both infections can result in serious disease with long lasting effects or possibly death. MenQuadfi should be used in accordance with official national guidelines.

How the vaccine works

MenQuadfi works by stimulating the vaccinated person natural defense (immune system), to produce protective antibodies against the bacteria. MenQuadfi only helps to protect against illnesses caused by *Neisseria meningitidis* types A, C, W and Y.

- It does not protect against infections caused by other types of *Neisseria meningitidis*.
- It does not protect against meningitis or septicaemia caused by other bacteria or viruses.

2. What you need to know before you are given MenQuadfi

Do not have MenQuadfi if you or your child

- are allergic to any of the active substances or any of the other ingredients of this vaccine (listed in section 6) or have experienced a previous allergic reaction to this vaccine.

If you are not sure, talk to your doctor, pharmacist or nurse before you or your child are given MenQuadfi.

Warnings and precautions

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before vaccination with MenQuadfi if you or your child have:

- an infection with high temperature (over 38°C). If this applies, the vaccination will be given after the infection is under control. There is no need to delay vaccination for a minor infection such as a cold. However, talk to your doctor, pharmacist or nurse first.
- a bleeding problem or bruise easily.
- ever fainted from an injection. Fainting, sometimes accompanied by falling, can occur (mostly in adolescents) after, or even before, any injection.
- a weak immune system (such as due to HIV infection, other disease, or use of a medicine that affect the immune system), as you or your child may not fully benefit from having MenQuadfi.

If any of the above apply to you or your child (or you are not sure whether they apply), talk to your doctor, pharmacist or nurse before you or your child are given MenQuadfi.

As with any vaccine, MenQuadfi may not fully protect all the people who are vaccinated.

Other medicines and MenQuadfi

Tell your doctor, pharmacist, or nurse if you or your child are taking, have recently taken or might take any other vaccines or medicines, including medicines obtained without a prescription.

In particular, tell your doctor, pharmacist, or nurse if you or your child are taking any medicines that affect your immune system, such as:

- high-dose corticosteroids
- chemotherapy.

MenQuadfi may be given at the same time as other vaccines at separate injection site during the same visit. These include measles, mumps, rubella, varicella, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, *Haemophilus influenzae* type b, hepatitis B, pneumococcal, and human papillomavirus and *Neisseria meningitidis* type B vaccines.

Pregnancy and breast-feeding

If you are pregnant, breast-feeding, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor, pharmacist, or nurse for advice before receiving MenQuadfi.

Driving and using machines

MenQuadfi is not likely to affect your ability to drive, cycle or use machines. However, do not drive, cycle or use any machines if you are not feeling well.

MenQuadfi contains sodium

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, this means that it is essentially ‘sodium-free’.

3. How MenQuadfi is given

MenQuadfi is given by a doctor or nurse as a 0.5 mL injection in the muscle. It is given in the upper arm or in the thigh depending on the age and how much muscle you or your child have.

4. Possible side effects

Like all vaccines, MenQuadfi can cause side effects, although not everybody gets them.

If you or your child get any of these symptoms after the vaccination:

- itchy skin rash
- shortness of breath
- swelling of the face or tongue.

Contact your doctor immediately. This could be signs of an allergic reaction.

Possible side effects in children aged 12 to 23 months:

- Very common** (may affect more than 1 in 10 children)
- tenderness, redness, or swelling where the injection was given
 - feeling irritable
 - crying
 - loss of appetite
 - feeling drowsy

Common

- (may affect up to 1 in 10 children):
- fever
 - vomiting
 - diarrhoea

Uncommon

- (may affect up to 1 in 100 people):
- difficulty sleeping
 - hives
 - itching, bruising, firmness, or rash where the injection was given

Possible side effects in children (2 years of age and older), adolescents and adults:

Very common

- (may affect more than 1 in 10 people)
- pain where the injection was given
 - muscle pain
 - headache
 - generally feeling unwell

Common

- (may affect up to 1 in 10 people)
- redness or swelling where the injection was given
 - fever

Uncommon

- (may affect up to 1 in 100 people)
- itching, warmth, bruising or rash where the injection was given

- vomiting
- feeling dizzy
- nausea
- fatigue (feeling tired)

Rare

- (may affect up to 1 in 1,000 people)
- enlarged lymph nodes
 - diarrhoea, stomach pain
 - hives, itching, rash
 - pain in the arms or legs
 - chills, pain in the armpit
 - injection site firmness

Reporting of side effects

If you or your child get any side effects, talk to your doctor, pharmacist, or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store MenQuadfi

Keep this vaccine out of the sight and reach of children. Do not use this vaccine after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Store in a refrigerator (2°C to 8°C).

Do not freeze.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What MenQuadfi contains

One dose (0.5 mL) contains:

- The active substances are: *Neisseria meningitidis* group A polysaccharide¹ 10 micrograms, *Neisseria meningitidis* group C polysaccharide¹ 10 micrograms, *Neisseria meningitidis* group Y polysaccharide¹ 10 micrograms, *Neisseria meningitidis* group W polysaccharide¹ 10 micrograms.

¹ Conjugated to tetanus toxoid carrier protein 55 micrograms.

- The other ingredients are: sodium chloride, sodium acetate, water for injections.

What MenQuadfi looks like and contents of the pack

MenQuadfi is a clear colourless solution for injection. MenQuadfi is available in packs of 1 or 10 single dose (0.5 mL) vials. Not all pack sizes may be marketed. **Manufactured by: Sanofi Pasteur Inc.,** Swiftwater, PA 18370 USA

This leaflet was last revised in 12/2022.

MenQuadfi®

solution injectable

Vaccin méningococcique conjugué des groupes A, C, W et Y

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce vaccin car elle contient des informations importantes pour vous ou votre enfant.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que MenQuadfi et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MenQuadfi
3. Comment utiliser MenQuadfi
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver MenQuadfi
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que MenQuadfi et dans quels cas est-il utilisé

MenQuadfi est un vaccin qui peut être utilisé chez les enfants à partir de 1 an, les adolescents et les adultes. MenQuadfi aide à protéger contre les infections dues à des bactéries (germes) appelées « *Neisseria meningitidis* » de types A, C, W et Y. Les bactéries « *Neisseria meningitidis* » (aussi appelées méningocoques) peuvent se transmettre de personne en personne et peuvent provoquer des maladies graves et parfois même mortelles telles que :

- une méningite – une inflammation des tissus recouvrant le cerveau et la moelle épinière.
- une septicémie – une infection du sang.

Ces deux infections peuvent entraîner des maladies graves avec des effets sur le long terme et potentiellement entraîner la mort.

MenQuadfi doit être utilisé en accord des recommandations nationales en vigueur.

Comment agit ce vaccin

MenQuafi agit en stimulant les défenses naturelles (système immunitaire) de la personne vaccinée, afin de produire des anticorps actifs contre la bactérie. MenQuadfi aide seulement à protéger contre les maladies dues à *Neisseria meningitidis* des types A, C, W et Y.

- Il ne protège pas contre les infections causées par d'autres type de *Neisseria meningitidis*.
- Il ne protège pas contre les méningites ou les septicémies causées par d'autres bactéries ou virus.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MenQuadfi

N'utilisez jamais MenQuadfi si vous ou votre enfant

Etes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ou si vous avez présenté précédemment une réaction allergique à ce vaccin.

Si vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier(ère) avant de recevoir MenQuadfi.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien, ou infirmier(ère) avant de recevoir MenQuadfi si vous ou votre enfant :

- Avez une infection avec de la fièvre (supérieure à 38°C). Si vous êtes dans ce cas, vous ne devrez pas être vacciné jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Une infection bénigne comme un rhume ne devrait pas être un problème. Cependant, parlez-en d'abord avec votre médecin ou votre infirmier(ère).
- Avez des problèmes de saignements ou vous vous faites des bleus facilement.
- Vous êtes déjà évanoui suite à une injection. Des évanouissements parfois accompagnés de

chutes peuvent survenir (principalement chez les adolescent) après ou même avant une injection.

- Avez un système immunitaire affaibli (par exemple à cause d'une infection par le VIH ou à cause d'une maladie ou de l'utilisation d'un médicament affectant le système immunitaire), car vous ou votre enfant pourriez ne pas obtenir tous les bénéfices attendus de MenQuadfi.

Si vous êtes dans l'un de ces cas (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier(ère) avant de recevoir MenQuadfi.

Comme pour tous les vaccins, MenQuadfi peut ne pas protéger totalement les personnes se faisant vacciner.

Autres médicaments et MenQuadfi

Informez votre médecin, votre pharmacien ou infirmier(ère) si vous ou votre enfant prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris des vaccins ou des médicaments obtenus sans ordonnance.

En particulier, informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère, si vous ou votre enfant prenez des médicaments pouvant affecter le système immunitaire comme par exemple :

- Haute dose de corticostéroïdes
- Chimiothérapie.

MenQuadfi peut être administré en même temps que d'autres vaccins, pendant le même rendez-vous, si les sites d'injections sont différents. Ceux-ci incluent la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, *Haemophilus influenzae* de type b, l'hépatite B, les pneumocoques et les infections à papillomavirus humain et les vaccins contre *Neisseria meningitidis* de type B.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre MenQuadfi.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que MenQuadfi affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Cependant, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

MenQuadfi contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, il est considéré comme « sans sodium ».

3. Comment utiliser MenQuadfi

Une dose de 0,5 mL de MenQuadfi vous sera administré, dans le muscle, par un médecin ou un(e) infirmier(ère). L'injection se fait dans la partie haute du bras ou dans la cuisse selon votre âge et votre masse musculaire ou celle de votre enfant.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ou votre enfant, après la vaccination, avez les symptômes suivants :

- Eruption cutanée avec démangeaisons
 - Essoufflement
 - Gonflement du visage ou de la langue. Contactez immédiatement votre médecin. Cela pourrait être les signes d'une réaction allergique.
- Potentiels effets indésirables chez l'enfant âgé de 12 à 23 mois :**
- **Très fréquent** (pouvant affecter plus d'un enfant sur 10)
 - Sensibilité, rougeur, ou gonflement au site d'injection
 - Sensation d'irritabilité
 - Pleurs
 - Perte d'appétit
 - Sensation de somnolence

Fréquent

(pouvant affecter jusqu'à un enfant sur 10)

- Fièvre
- Vomissement
- Diarrhée

Peu fréquent

(pouvant affecter jusqu'à un enfant sur 100)

- Difficultés à dormir
- Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire)
- Démangeaisons (prurit), bleus (ecchymoses), durcissement (induration) ou éruption cutanée au site d'injection

FRONT

Potentiels effets indésirables chez l'enfant (de 2 ans et plus), l'adolescent et l'adulte

Très fréquent (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- Douleur au site d'injection
- Douleur musculaire
- Maux de tête
- Malaise général

Fréquent (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- Rougeur ou gonflement au site d'injection
- Fièvre

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

- Démangeaisons (prurit), chaleur, bleus (ecchymoses) ou éruption cutanée au site d'injection
- Vomissement
- Sensation de vertige
- Nausées
- Fatigue (se sentir fatigué)

Rare (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1000)

- Ganglions lymphatiques hypertrophiées
- Diarrhées, douleurs à l'estomac
- Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire), démangeaisons (prurit), éruption cutanée
- Douleur dans les bras ou les jambes
- Frissons, douleur à l'aisselle
- Durcissement (induration) au site d'injection

Déclaration des effets secondaires

Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver MenQuadfi

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP.

A conserver au réfrigérateur (2°C et 8°C).

Ne pas congeler.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations Ce que contient MenQuadfi

Une dose (0,5 mL) contient :

- Les substances actives suivantes: Polyoside de *Neisseria meningitidis* groupe A¹ 10 microgrammes, Polyoside de *Neisseria meningitidis* groupe C¹ 10 microgrammes, Polyoside de *Neisseria meningitidis* groupe Y¹ 10 microgrammes, Polyoside de *Neisseria meningitidis* groupe W¹ 10 microgrammes.
¹ Conjugué à l'anatoxine tétanique en tant que protéine vectrice 55 microgrammes
- Les autres ingrédients sont : Chlorure de sodium, Acétate de sodium, Eau pour préparations injectables.

Comment se présente MenQuadfi et contenu de l'emballage extérieur

MenQuadfi est une solution injectable transparente et incolore.

MenQuadfi est disponible en présentation de 1 ou 10 flacons d'une dose (0,5 mL).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Fabriqué par: Sanofi Pasteur Inc., Swiftwater, PA 18370, États-Unis

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 12/2022.

MenQuadfi®

solución inyectable

Vacuna conjugada frente a meningococo de los grupos A, C, W e Y

Lea todo el prospecto detenidamente antes de que usted o su hijo reciban este vacuna, porque contiene información importante para usted o su hijo.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted o a su hijo y no debe dárselo a otras personas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

- Qué es MenQuadfi y para qué se utiliza
- Qué necesita saber antes de que usted o su hijo reciban MenQuadfi
- Cómo usar MenQuadfi
- Posibles efectos adversos
- Conservación de MenQuadfi
- Contenido del envase e información adicional

1. Qué es MenQuadfi y para qué se utiliza

MenQuadfi es una vacuna que puede administrarse a niños desde 1 año de edad, adolescentes y adultos.

MenQuadfi ayuda a proteger frente a infecciones causadas por un tipo de bacteria (gérmenes) llamada "*Neisseria meningitidis*", específicamente frente a los tipos A, C, W e Y. La bacteria *Neisseria meningitidis* (también llamada meningococo) puede transmitirse de persona a persona y puede causar infecciones graves y a veces potencialmente mortales, como:

- Meningitis – una inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal;
- Septicemia – una infección de la sangre.

Ambas infecciones pueden provocar enfermedad grave con efectos duraderos o posiblemente la muerte. MenQuadfi debe usarse de acuerdo con las recomendaciones nacionales oficiales.

Cómo actúa la vacuna

MenQuadfi actúa estimulando la defensa natural (sistema inmunológico) de la persona vacunada para producir anticuerpos protectores frente a la bacteria. MenQuadfi solo ayuda a proteger frente a las enfermedades causadas por *Neisseria meningitidis* de los tipos A, C, W e Y.

- No protege frente a infecciones causadas por otros tipos de *Neisseria meningitidis*.
- No protege frente a la meningitis o la septicemia causada por otras bacterias o virus.

2. Qué necesita saber antes de recibir MenQuadfi No use MenQuadfi si usted o su hijo

- es alérgico a alguno de los principios activos o a alguno de los demás componentes de esta vacuna (incluidos en la sección 6) o ha experimentado una reacción alérgica previa a esta vacuna.

Si no está seguro, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de que usted o su hijo reciban MenQuadfi.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de la vacunación con MenQuadfi si usted o su hijo presentan alguna de las siguientes condiciones:

- una infección con fiebre alta (más de 38 °C). Si esto ocurre, la vacuna se administrará después de que la infección esté bajo control. No es necesario retrasar la vacunación en caso de una infección menor como un resfriado. Sin embargo, consulte primero a su médico, farmacéutico o enfermero.
- un problema de sangrado o le salen moratones con facilidad.
- se han desmayado alguna vez a causa de una inyección. Después o incluso antes de cualquier inyección puede producirse un desmayo, a veces acompañados de caídas (principalmente en adolescentes).

- un sistema inmunológico débil (por ejemplo, debido a una infección por VIH, otra enfermedad o el uso de un medicamento que afecte al sistema inmunológico), ya que es posible que usted o su hijo no se beneficien completamente de recibir MenQuadfi.

Si algo de lo anterior aplica a usted o a su hijo (o si no está seguro de si aplica), consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de que usted o su hijo reciban MenQuadfi.

Como con cualquier vacuna, la vacunación con MenQuadfi puede no proteger a todos los sujetos vacunados.

Otros medicamentos y MenQuadfi

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero si usted o su hijo están utilizando, han utilizado recientemente o podrían tener que utilizar otra vacuna o medicamento, incluyendo los medicamentos adquiridos sin receta.

En particular, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero si usted o su hijo están tomando algún medicamento que afecte su sistema inmunológico, como:

- corticosteroides en dosis altas
- quimioterapia.

MenQuadfi se puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas en lugares de inyección separados durante la misma visita. Estas incluyen vacunas frente alsarampión, paperas, rubéola, varicela, difteria, tétanos, tos ferina, polio, Haemophilus influenzae tipo b, hepatitis B, infecciones neumocócicas, virus del papiloma humano y Neisseria meningitidis tipo B.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de recibir MenQuadfi.

Conducción y uso de máquinas

No es probable que MenQuadfi afecte a su habilidad para conducir, montar en bicicleta o utilizar máquinas. Sin embargo, no conduzca, monte en bicicleta ni utilice máquinas si no se siente bien.

MenQuadfi contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, es esencialmente "exento de sodio".

3. Cómo usar MenQuadfi

MenQuadfi es administrada por un médico o enfermero como una inyección de 0,5 mL en el músculo. Se administra en la parte superior del brazo o en el muslo dependiendo de la edad y de la cantidad de músculo que tenga usted o su hijo.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todas las vacunas, MenQuadfi puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Comuníquese con su médico inmediatamente si usted o su hijo presentan alguno de estos síntomas después de la vacunación ya que pueden ser signos de una reacción alérgica:

- erupción cutánea con picazón
- dificultad para respirar
- hinchazón de la cara o la lengua.

Posibles efectos adversos en niños de 12 a 23 meses:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- sensibilidad, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de inyección
- irritabilidad
- llanto
- pérdida de apetito
- somnolencia

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- fiebre
- vómitos
- diarrea

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- dificultad para dormir
- habón urticarial
- picazón, moratones, induración o erupción en el lugar de inyección

Posibles efectos adversos en niños (2 años de edad y mayores), adolescentes y adultos:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 niños)

- dolor en el lugar de inyección
- dolor muscular
- dolor de cabeza
- sensación de malestar general

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 niños)

- enrojecimiento o hinchazón en el lugar de administración
- fiebre

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- picazón, calor, hematomas o erupción en el lugar de inyección
- vómitos
- mareos
- náuseas
- fatiga (sentirse cansado)
- Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)
- ganglios linfáticos agrandados
- diarrea, dolor de estómago
- habón urticarial, picazón, erupción cutánea
- dolor en los brazos o piernas
- escalofríos, dolor en la axila
- induración en el lugar de inyección

Comunicación de efectos adversos

Si usted o su hijo experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de MenQuadfi

Mantener esta vacuna fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice esta vacuna después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD.

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

No congelar.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de MenQuadfi

Una dosis (0,5 mL) contiene:

- Los principios activos son: Polisacárido de *Neisseria meningitidis* del grupo A¹ 10 microgramos, Polisacárido de *Neisseria meningitidis* del grupo C¹ 10 microgramos, Polisacárido de *Neisseria meningitidis* del grupo Y¹ 10 microgramos, Polisacárido de *Neisseria meningitidis* del grupo W¹ 10 microgramos.
¹ Conjugado con proteína transportadora de toxoide tetánico 55 microgramos
- Los demás ingredientes son: Cloruro de sodio, Acetato de sodio, Agua para preparaciones inyectables.

Aspecto del producto y contenido del envase

MenQuadfi es una solución inyectable transparente e incolora.

MenQuadfi está disponible en envases de 1 o 10 viales de dosis única (0,5 mL). Puede que solo estén comercializados algunos tamaños de envases.

Fabricado por: Sanofi Pasteur Inc., Swiftwater, PA 18370 EE. UU.

Fecha de la última revisión de este prospecto 12/2022.

sanofi

BACK

MenQuadfi®		Package Insert 10x1 2 mL Vial Standard Export - Hybrid Finished Good #: 841318	
Artwork Drawing Version #: 4 Document #: SWT-SPC-001503 Reference: ID 4,5,6,10,11,12,13 Insert Dimensions: 317.5 mm x 349.25 mm Final Fold Dimensions: 69.85 mm x 31.75 mm Packaging Site: Swiftwater Package Insert to scale.		Part Number: 897932 File Name: 395 PI 897932 V5 SEP Hybrid 10x1 22Nov23 Date: 22 November 2023 Initials: TY Version: 5 Fonts: Noto Sans Condensed Internal Reference Numbers: OCRB	
Colour : Black		2D Material Code: 897932	